


De-labelling PNC alergie projekt MU+FN Brno

MUDr.Mgr. Jiří NEVRLKA^{1,2,3}

Doc.RNDr.Lenka ZDRAŽILOVÁ-DUBSKÁ,PhD.^{1,3}

1. ÚLM MU Brno a FN Brno, 2. KNPT FN Brno,
3. Farmakologický ústav LF MU Brno,

Peniciliny



Betalaktamová ATB, původně produkty hub- *Penicillium notatum*
Struktura - vždy čtyřčlenný betalaktamový kruh, který je
společný všem betalaktamovým antibiotikům.
U penicilinů je spojen thiazolidinovým pětičlenným kruhem

Datum vytvoření : 12/2024

Datum Exspirace: 02/2025

OBSAH

- Proč PNC alergie (alergie na beta-laktamy) - epidemiologie
- Chybná diagnóza (label) „PNC alergie“ a její důsledky
- Vyšetření (verifikace labelu) „PNC alergie“ – klasický model (via alergolog)
 - Teorie
 - Praxe
- Vyšetření (verifikace labelu) „PNC alergie“ – zjednodušený model (de-labeling)
 - Zahraniční protokoly (BSACI guidelines)
 - Návrh protokolu pro FN Brno

Prezentace bude dostupná (a po finalizaci návrhu protokolu FNB aktualizovaná)
na

<https://www.upira.cz/pro-lekare/>

PNC alergie – label vs. realita

EPIDEMIOLOGIE

PNC alergie - label

- Nejčastěji udávaná léková alergie, více než 10% populace v Evropě a Severní Americe. vs. Alergii na penicilin má 5,6 % běžné populace UK.¹
- U hospitalizovaných pacientů častější

PNC alergie - realita

- Přibližně 95% diagnóz „alergie na PNC“ je při testování neverifikováno.²
- U dětí jsou pravé alergické reakce na penicilin ještě méně časté než u dospělých. Zejména u dětí mladších 4 let se často objevují kopřivkové nebo makulopapulózní kožní vyrážky, které se zřídka opakují při následném testování.³

¹ West RM, Smith CJ, Pavitt SH, et al. Warning: allergic to penicillin: association between penicillin allergy status in 2.3 million NHS general practice electronic health records, antibiotic prescribing and health outcomes. *J Antimicrob Chemo*. 2019;74(7): 2075-2082., 2 Blumenthal KG, Huebner EM, Fu X, et al. Risk-based pathway for outpatient penicillin allergy evaluations. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2019;7(7):2411-2414., 3 Arnold A, Sommerfield A, Ramgolam A, et al. The role of skin testing and extended antibiotic courses in assessment of children with penicillin allergy: an Australian experience. *J Paed Child Health*. 2019;55(4):428-432.)

PNC alergie – label vs. realita

důvody rozporu

Chybná interpretace (problému za léčby)

- známých předvídatelných nežádoucích účinků (např. čistě gastrointestinální příznaky v důsledku změny střevního mikrobiomu)
- kopřivky vyvolané infekcí a jiných typicky virových exantémů
- obecných nespecifických příznaků a somatoformních reakcí

Chybné posouzení rizik (pro budoucí léčbu)

- Léková alergie časná > Léková alergie pozdní > Lék.pseudoalergie > nonB reakce polékové (nejde o LHR) > s lékem nesouvisející reakce
- Rizika zkřížených reakcí mezi beta-laktamy

LÉKOVÉ ALERGIE

Lékové nežádoucí účinky

(Adverse drug reaction, definice WHO)

= výrazně škodlivé nebo nepříjemné reakce, vzniklé následkem intervence **související s použitím léčivého přípravku**, které **predikují riziko při budoucím podání** a opravňují k prevenci nebo specifické léčbě nebo změně dávkovacího režimu nebo vysazení přípravku.

- prevalence cca 10-20% hospitalizovaných, cca 7% ambulantních pacientů.

KLASIFIKACE:

- **A (augmented):** farmakologické, předvídatelné, reverzibilní, na dávce závislé NÚ. Cca 80% NÚ.
- **B (bizarre):** typicky nepředvídatelné a na dávce nezávislé NÚ u predisponovaných jedinců. Zahrnuje LHR alergické i nealergické + intolerance a idiosynkrazie (averze). Cca 10-15% NÚ.
- **C (chronic):** NÚ dané následky dlouhodobého užívání léků, závislé na dávce a délce léčby (např. SKS – útlum adrenální osy, Benzodiazepiny – závislost)
- **D (delayed):** NÚ karcinogenní a teratogenní, závisí na dávce a době léčby, mohou se projevit i s odstupem od ukončení léčby .
- **E (end of use):** NÚ vznikající při přerušení či vysazení léčby (např. opiáty - abstinenciální příznaky)
- **F (failure):** NÚ dané lékovými a lékově-potravinovými interakcemi.

5 22.02.2025

LÉKOVÉ ALERGIE

Lékové hypersenzitivní reakce (LHR / DHR)

= nežádoucí účinky léčiv, které svým klinickým obrazem odpovídají alergické reakci.

.. tvoří 15 % všech nežádoucích účinků léčiv a postihují více než 7 % obecné populace.

LHR alergické („lékové alergie“) = prokázán konkrétní imunologický mechanismus.

.. nežádoucí reakce, u kterých se uplatňují protilátky a/nebo aktivované T-lymfocyty proti lékům nebo jejich metabolitům.

.. vynucují změnu léčby a mohou být potenciálně život ohrožující.



LHR nealergické („lékové pseudoalergie“) = neúčastní se imunologický mechanismus.

6 22.02.2025

LÉKOVÉ ALERGIE

Patofyziologie - LHR / DHR NEalergické

- ✓ **Nespecifické uvolnění histamINU z žírných buněk a bazofilů** (např. opiáty, rentgen-kontrastní látky a vankomycin).
- ✓ **Nahromadění bradykininu** (inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu).
- ✓ **Neimunitní aktivace komplementu** (např. protamin).
- ✓ **Alterace metabolismu kyseliny arachidonové** (např. aspirin a NSA).
- ✓ **Farmakologicky navozený bronchospasmus** (např. betablokátory, oxid siřičitý uvolněný z léčivých přípravků obsahujících siřičitan).
- ✓ **Interakce léku s virovou infekcí** (např. "ampicilinový rash" spojený s EBV nebo souvislost mezi HHV-6 a DRESS).


7 22.02.2025

LÉKOVÉ ALERGIE

Klinická klasifikace LHR alergických

LHR časné (immediate)

.. během 1-(6) hodin po posledním podání léku (typicky během první hodiny).



pozn.: je nutné brát v úvahu

- ✓ cestu podání
- ✓ metabolismus léků
- ✓ přítomnost kofaktorů
- ✓ souběžně podávanou medikaci ovlivňující nástup a progresi LHR.

LHR pozdní (non-immediate/delayed)

.. v intervalu delším než 1 hodina od iniciálního podání léku (typicky za 12-24 hodin).

8 22.02.2025

LÉKOVÉ ALERGIE

Klinická klasifikace LHR alergických - projevy

LHR časné (immediate)

.. typicky časný IgE mediovaný mechanismus.

.. typické příznaky: → časná urtikarie, angioedém

→ rýma, zánět spojivek, bronchospasmus

→ gastrointestinální symptomy (nausea, zvracení, průjem)

→ až anafylaxe, která může vést až k selhání oběhu (anafylaktický šok).



LHR pozdní (non-immediate/delayed)

.. typicky opožděný alergický mechanismus závislý na T-lymfocytech.

.. typické příznaky: → kožní: makulopapulózní exantém a opožděná urtikarie, fixní lékové erupce > vaskulitidy až těžké dermatózy (TEN, SJS, AGEP, SDRIFE).

→ postižení vnitřních orgánů a krvetvorby +/- kožní příznaky: HSS/DRESS/DiHS, vaskulitidy a SJS/TEN - jaterní postižení (DILI), renální selhání, plicní postižení - anémie, neutropenie, trombocytopenie, sérová choroba.

PNC alergie – label vs. realita

důsledky chybného „labelu“ PNC alergie

Důsledky zdravotní ¹

- předepisování méně vhodných antibiotik ("druhá volba")
- zpoždění antibiotické léčby
- větší výskyt zárodků rezistentních vůči antibiotikům, zvyšuje riziko infekcí MRSA, *C. difficile* a VRE nebo častější selhání léčby
- delší doba hospitalizace, častější léčba na jednotce intenzivní péče, vyšší riziko úmrtí

Důsledky ekonomické ²

- vyšší náklady na zdravotní péči (ambulantní i hospitalizační)
- je prokázán ekonomický přínos revize chybné diagnózy „PNC alergie“.

¹ Macy E, Contreras R J health care use and serious infection prevalence associated with penicillin allergy in hospitalised patients:a cohort study. *J Allergy Clin Immunol*. 2014;133(3):790-796. + Blumenthal KG, Lu N, Zhang Y, et al. Risk of methicillin resistant *Staphylococcus aureus* and *Clostridium difficile* in patients with a documented penicillin allergy: population based matched cohort study. *BMJ*. 2018;27(361).

² Mattingly TJ, Fulton A, Lumish RA, et al. The cost of self-reported penicillin allergy: a systematic review. *J Allergy Clin Immunol*. 2018;6(5):1649-1654 + Sousa-Pinto B, Blumenthal KG, Macy E, et al.


Penicillin allergy testing is cost-saving: an economic evaluation study. *Clin Infect Dis*. 2021;72(6):924-938.

Léková (PNC) alergie – vyšetření

KDY VYŠETŘUJEME ?

KDY VYŠETŘOVAT ?

- ✓ anamnéza předchozí LHR + lék je potřebný + nemá srovnatelně účinnou a strukturně nepříbuznou alternativu + poměr přínosu a rizika je příznivý.
- ✓ anamnéza předchozí těžké LHR na neznámý lék (nalezení příčinného léku je nejlepší způsob, jak pacienta chránit).



KDY NEVYŠETŘOVAT ?

- ✓ není kauzalita lékové alergie (nekompatibilní symptomatologie, časový průběh, léky následně tolerované, reakce vyskytující se bez předchozího užívání léku).
- ✓ nekompatibilní diagnóza (např. herpetický výsev, chronická kopřivka).
- ✓ provokační lékové testy, pokud původní reakce byla příliš závažná (nekontrolovatelná reakce a těžké život ohrožující reakce).
- ✓ screening osob bez předchozí alergické lékové reakce (výjimky)

Léková (PNC) alergie – vyšetření (klasický model)

ALERGOLOGIE - teorie

- Definice
- Klasifikace LHR
- **Diagnóza:** Demoly P, et al. International Consensus (ICON) on Drug Allergy. Allergy 2014; 69:420-437. (česká verze ke stažení: https://eaaci.org/...ICON_Drug_Allergy_Czech-web.pdf)
 - Anamnéza
 - **Laboratorní testy:** Sedláčková L. In vitro diagnostika hypersenzitivních reakcí vyvolaných léky. Alergie 2013; 1:62-67.
 - **Kožní testy:** Sedláčková L, et al. Kožní testy v diagnostice lékové alergie (Doporučení Pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAK). Alergie 2015; 4:268-276.
 - Provokační testy
 - Praxe CZ
- Možnosti řešení (desenzibilizace)



<https://www.upira.cz/pro-lekare/>

Léková (PNC) alergie – vyšetření (klasický model)

guidelines

- ✓ **International Consensus (ICON) on Drug Allergy.** (Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International consensus on drug allergy. *Allergy*. 2014;69(4):420-437, česká verze ke stažení: https://eaaci.org/...ICON_Drug_Allergy_Czech-web.pdf)
- ✓ **BSACI GUIDELINE: Management of allergy to penicillins and other beta-lactams.** (R. Mirakian, S. C. Leech, M. T. Krishna, et al. Management of allergy to penicillins and other beta-lactams. *Clinical & Experimental Allergy*, 2015 (45) 300–327.)
- ✓ **EAACI position paper – Dokumentace pro pacienty s lékovou hypersenzitivitou** (Brockow K, Aberer W, Atanaskovic-Markovic M, Bavbek S, et al. Drug allergy passport and other documentation for patients with drug hypersensitivity – An ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group Position Paper. *Allergy*. 2016; 71: 1533–1539),
- ✓ **EAACI position paper – Klasifikace kožních manifestací lékové hypersenzitivity** (Brockow K, Ardern-Jones MR, Mockenhaupt M, et al. EAACI position paper on how to classify cutaneous manifestations of drug hypersensitivity. *Allergy*. 2019;74:14–27.,
- ✓ **EAACI position paper - Diagnostika a management léky indukované anafylaxe u dětí** (Atanaskovic-Markovic M, Gomes E, Cernadas JR, et al. Diagnosis and management of drug-induced anaphylaxis in children: An EAACI position paper. *Pediatr Allergy Immunol*. 2019;30:269–276. <https://doi.org/10.1111/pai.13034>),
- ✓ **EAACI position paper – Přesnější diagnostika hypersenzitivity na beta-laktamy.** (Romano A, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, et al. Towards a more precise diagnosis of hypersensitivity to beta-lactams – an EAACI position paper. *Allergy*. 2020; 75: 1300–1315.)
- ✓ Sedláčková L, et al. Kožní testy v diagnostice lékové alergie (Doporučení Pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAKI). *Alergie* 2015; 4:268–276.)

13 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – vyšetření (klasický model)

• důkladná anamnéza

ALERGOLOGIE

• in vitro (laboratorní) testy

.. bezpečné, jednoduše proveditelné (i ambulantně)

x omezený počet, obvykle neznámá či slabá výpovědní hodnota


• in vivo testy

.. dobrá výpovědní hodnota, kompletní spektrum léků

x riziko pro pacienta, pracnost a čas, vhodné lůžkové zázemí

standardizované kožní testy

provokační testy lékem (DPT)



14 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – vyšetření (klasický model)

Praxe¹

- Testování v současné době provádějí alergologové pracující na specializovaných klinikách, a proto je omezeno na vybrané skupiny pacientů.
- Tento model nemůže uspokojit současnou ani budoucí poptávku a znemožňuje přístup k testování naprosté většiny pacientů.

ALERGOLOGIE – praxe

Důvody²

- Příliš málo alergologů se zkušenostmi v této oblasti.
- ✓ Podmínky DPT (lékového provokačního testování) nejsou standardizovány.
- ✓ Laboratorní testy pro detekci alergie nejsou dostatečně validovány (sIgE ATB PNC typu: senzitivita 40-60% x specifita 10-95%).
- ✓ Kožní testování je časově a finančně náročné a nejsou dostupná potřebná diagnostika (SPT: PNC hlavní alergenní determinanta (benzylpeniciloyl -octa-L-lysine), PNC vedlejší alergenní determinanta (peniciloát sodný), amoxycilin, ..).

¹ Dworzynski K, Ardern-Jones M, Nasser S. Diagnosis and management of drug allergy in adults, children and young people: summary of NICE guidance. BMJ. 2014;3(349):4852., 2 Brockow K, Wurpts G, Trautmann A. Patients with questionable penicillin (beta-lactam) allergy: Causes and solutions. Allergol Select. 2022; 6: 33-41. DOI 10.5414/ALX02310E

15 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – vyšetření (klasický model)

LÉKOVÁ CENTRA (dle www.csaki.cz): název, adresa	konzultující lékař vs. omezení	kontakt
Ústav klinické imunologie a alergologie, FNUSA Brno Pekařská 53, 656 91 Brno	MUDr. Sáva Pešák	tel: 543 183 121 mail: sava.pesak@fnusa.cz
AKIMED s.r.o., alergologická amb., Brno Božetěchova 79, 612 00 Brno	Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.	tel: 724 501 151 mail: vojtech.thon@recetox.muni.cz
Klinika nemoci kožních a pohlavních, FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové	Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. X - pouze kožní projevy	tel: 495 836 389
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové	MUDR. Irena Krčmová, CSc. MUDR. Adriana Šrotová	tel: 495 833 771, 602 828 310, 495 833 781 mail: irena.krcanova@fhnk.cz, adriana.srotova@fhnk.cz
Alergologická amb., Dětské odd., Oblastní nemocnice Kolín Žižkova 146, 280 00 Kolín	MUDr. Jaromír Paukert	tel: 321 756 418 mail: jaromir.paukert@nemocnicekolin.cz
Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc	MUDr. Mojmir Račanský	tel: 588 443 245 - LA, NSA, β-lakt. ATB, antikoagulanční
Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň Alez Svobody 80, 304 60 Plzeň	MUDr. Martin Líska, PhD. - děti MUDr. Radka Galanská, PhD. - dospělí	tel: 377 103 399 mail: liska@fplzen.cz, galanskra@fplzen.cz
Laboratoř klinické imunologie FN Královské Vinohrady Praha Šrobárova 50, 100 34 Praha 10	Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. X - Anestetika lokální i celková	tel: 267 162 917 mail: petr.kucera@fnkv.cz
Ústav imunologie 2. LF a FN Motol Praha V Úvalu 84, Praha 5	MUDr. Marta Sobotková	tel: 261 362 399, 261 362 322 - LA, NSA, ATB, jodové KL
IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny), Praha Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4	MUDr. Margareta Beyrová, MUDr.	tel: 261 362 399, 261 362 322 - pacienti IKEM nebo domluva
Immunita spol.s.r.o. Praha Křížíkova 147/77, 186 00 Praha 8	MUDr. Eva Daňková, CSc., MUDr. Iveta tel: 224 829 466 X - konzultace a lab. testy	mail: dankova@immunita.org, setinova@immunita.org
Gennet s.r.o., alergologická amb., Praha Kostelní 9, 170 00 Praha 7	MUDr. Lenka Sedláčková	tel: 603 440 238 mail: lenka.sedlacekova@gennet.cz
Oddělení KIA, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem	MUDr. Dalibor Jílek, CSc., MUDr. Jiří tel: 477 114 416	mail: okiamn@kzcr.eu
Alergologická amb. plicního odd. KN Tomáše Bati Zlín Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín	MUDr. Pavel Štach	577 552 137, 577 552 621 stach.pavel@gmail.com

ALERGOLOGIE – praxe

"Léková centra"
<https://www.csaki.cz/sit-pracoviste>

16 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – vyšetření (zjednodušený model)

- důkladná anamnéza

- in vitro (lat. v kultuře) testy

.. bezpečné, jednoduché, rychlé, vedení vede vedení vedení (i ambulantně)
x omezený počet reaktivů, nespecifické reakce, neznámá či slabá výpovědní hodnota


- in vivo testy

.. dobrá výpověď, vysoká specifita, kompletní spektrum léků
x riziko pro potenciální závažné reakce, čas, vhodné lůžkové zázemí

standardní provokační testy

Přímé provokační testy lékem (directDPT)

17 22.02.2025



PNC alergie – vyšetření (zjednodušený model)

Proč ?

Předpoklady

- Lékový provokační test (DPT) je považován za zlatý standard pro potvrzení nebo vyvrácení diagnózy alergie.
- Klasické pokyny pro testování alergie na PNC doporučují použití kožního testu před DPT jako prostředku k včasnému posouzení pravděpodobnosti pozitivní provokace.¹ x **V posledních letech** několik studií prokázalo, že je možné identifikovat pacienty s nízkým rizikem alergie na PNC pouze na základě alergologické anamnézy.²
- **Zdá se tedy, že je bezpečné a účinné nabídnout některým pacientům přímý lékový provokační test (DPT) bez předchozího kožního testu.**³

Výhody

- Tento postup nabízí potenciál pro testování ve velkém měřítku, protože umožňuje de-labelling pro značnou část pacientů v prostředí mimo alergologické pracoviště.
- Je to také méně nákladné a pro pacienta to může být přijatelnější (méně invazivní).
- **Pro děti existují studie použití DPT v zařízeních primární péče, které naznačují, že je DPT bezpečná a přijatelná nejenom pro pacienty, ale i rodiče a poskytovatele.**⁴

¹ Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International consensus on drug allergy. *Allergy*. 2014;69(4):420–437. ². např. Chua KYL, Vogen S, Bury S, et al. The penicillin allergy delabeling program: a whole-of-hospital health services intervention and comparative effectiveness study. *Clin Infect Dis*. 2021;73(3):487–496. ³. BSACI guideline for the set-up of penicillin allergy de-labelling services by non-allergists working in a hospital setting (Savic L, et al. *Clin Exp Allergy*. 2022;52:1135–1141.). ⁴. Chigullapalli S, Cartland S, Bilal S. Parents and primary care perspectives on penicillin de-labelling in children. *Clin Exp Allergy*. 2021;51(1):182

18 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – důkladná anamnéza

limity

- **Příznaky**
 - kompatibilita s LHR?
 - **Časový průběh příznaků**
 - předchozí expozice
 - interval mezi poslední dávkou a nástupem příznaků
 - efekt přerušení léčby
 - **Ostatní užívaná medikace**
 - **Předchozí zdravotní potíže**
 - včetně jiných alergií a nemocí jako chronická kopřivka nebo chronická sinusitida

! Časné vphotovení !

LÉKOVÁ HYPERSENZITIVITA		Číslo protokolu: _____	mmstř
VÝSETRUJÍCÍ:	Příjmení Jméno PACIENT:	Tel. Fax. E-mail Istnou: _____ Váha: kg Výška: cm Pohlaví: M / ž Povolení: Rizikové skupiny: zdravotníků / lekářských primysl: hematologie / specifikace	Datum narození: _____ let
VÝSLEK OSNOVOCENÍ:		■ HYPOZENY □ výčet □ nová obhlížka □ specifikace	
		■ HYPERZENY PRÍZNAMY □ značky / počátky reakce □ mimoř. □ zvýrazněn / hyperventilačné □ pocení □ jaz / specifikace	
		■ POZITIVNÉ DALŠÍCH ORGÁNÓV (přenětí neurotické, pozitivní plci, cytopenze atd.)	
LÉKOVÁ REAKCE:		■ KLINICKÝ PRŮBĚH:	
		■ Seznam všechn léků včetně průdejních, přírodních léčivých prostředků a potravin obsahujících lécovin v době reakce	
		■ SUSPEKTNÍ LÉKY:	
		Generický název s atenu / indikace	
		Datum dívka: cesta poslání délka terapie: _____	Interval mezi dívky a rekrea.
		mg/d: _____ d	Předchozí léba tuto rekon.
		mg/d: _____ d	□ se ne □ mo -> plízinky
		mg/d: _____ d	□ se □ mo -> plízinky
		mg/d: _____ d	□ se □ mo -> plízinky
		mg/d: _____ d	□ se □ mo -> plízinky
		mg/d: _____ d	□ se □ mo -> plízinky
		mg/d: _____ d	□ se □ mo -> plízinky
		mg/d: _____ d	□ se □ mo -> plízinky
		mg/d: _____ d	□ se □ mo -> plízinky
■ EFLORESCENCE : Distribuce / Dynamika (1)		■ SOLUČN. □ cip-blockeray	
		□ antihistamika	
<p>■ GASTROINTESTINÁLNÍ A RESPIRAČNÍ PRÍZNAMY</p>		■ OPATŘENÍ POUŽITÁ K:	
■ naštvan. / zvýšení ■ výsek ■ zlín kůže ■ kábel ■ dysfonie ■ EEF nebo FEV1 ■ pukaty / bronchospazm ■ rýma ■ výsek z nosu		□ bez léky □ kortik. □ bronchodil. □ betah. □ základní jídlo / leč. □ typ: zákev: □ jaz / specifikace □ jaz / specifikace □ základní dárky (ok)	
■ generální rozšíření ■ postradatelnost ■ pocení ■ zvýšení ■ malosten ■ bolest / palení / lokalizace ■ smrtká / myalgia / lokalizace ■ jaz / specifikace ■ jaz / specifikace		■ OSORNÁ ANAMNÉZA: 1) BYLY PODOBNÉ PRÍZNAMY POZOROVANÝ I BEZ POZVÁNÍ SUSPEKTNÉHO LÉKU? <input checked="" type="checkbox"/> Je to <input checked="" type="checkbox"/> ne	
■ HEARTOVÝ / KARDIOVASKULÁRNÍ PRÍZNAMY ■ tepličkové pulsy mm			

19 22.02.2025

22.02.2025

Léková (PNC) alergie – directDPT

limity

- kontraindikace

- nekontrolovatelné a/nebo těžké život ohrožující LHR (těžké kožní reakce např. SJS, TEN, DRESS, vaskulitis, AGEP, systémové reakce např. DRESS, postižení vnitřních orgánů, hematolog.reakce)
 - **anafylaxe** (DPT aplikujeme jen v případě negativních alergologických testů)
 - závažné souběžné onemocnění a těhotenství (s výjimkou léku nezbytného pro toto onemocnění nebo během těhotenství či porodu) – např. těžké a nekontrolované AB a CHOPN, těžká aortální stenóza, obecně kardiovaskulární nestabilita.

- zvážit cost/benefit

- potřeba léku** - není indikováno, pokud dotyčný lék pravděpodobně nebude znova potřeba a existuje několik strukturně nepřibuzných náhradních léků.

- prevence nežádoucích reakcí

- provádět v podmírkách zajišťujících co nejvyšší bezpečnost - vyškolený personál (informovaný o probíhajícím testu, připravený identifikovat časné příznaky pozitivní reakce a připravený zvládnout život ohrožující reakci) + dostupné vybavení pro okamžitou resuscitaci.
➤ přednost se dává nerovnáčkové cestě nedávání

→ prioritățile se dava perioritățile ceste podații

20 22.02.2025

22.02.2025

Léková (PNC) alergie – stratifikace rizika

limity

Nízké riziko neboli pacienti vhodní pro přímý DPT

- ✓ Definice "nízkého rizika" se liší. Podíl pacientů vhodných pro přímý DPT může být až 65%. ¹
- ✓ Doporučení pro děti všech věkových kategorií jsou stejná jako pro dospělé.

Podprahové stavy – žádné riziko

- Příznaky a situace, které jsou v souladu nejvýše s neimunologickými vedlejšími účinky PNC antibiotik a jsou téměř s jistotou nealergickými jevy.
- Tito pacienti nevyžadují alergologické testy, ale ani DPT. Některí pacienti se však mohou PNC antibiotikům nadále vyhýbat, pokud nemají jistotu negativního alergologického testu. Za těchto okolností je třeba zvážit provedení DPT.



A. Přímý de-labelling

Nízkorizikové stavy – nízké riziko

- Příznaky a situace, které jsou v souladu s neimunologickými vedlejšími účinky PNC antibiotik a jsou pravděpodobně nealergickými jevy.
- Tito pacienti nevyžadují alergologické testy ve formě kožních testů, ale jsou vhodní jsou vhodní pro přímou DPT, a to i prováděnou nealergologem mimo alergologickou ambulanci.



B: přímý DPT

Rizikové stavy – střední a vysoké riziko

- Příznaky a situace, které se shodují se bud's okamžitými reakcemi přecitlivělosti typu 1 (zprostředkovány IgE), nebo s opožděnými reakcemi typu 4 (typicky zprostředkovány T-buňkami).
- Tito pacienti nejsou považováni za vhodné pro přímou DPT a vyžadují posouzení alergologem.

C. Reference ad 207 lékové centrum (plně alerg. vyšetření)


¹ Savic L, Thomas C, Fallaha D, et al. DALES, drug allergy labels in elective surgical patients: a prosp.multic. cross-sectional study of incidence, risks, and attitudes in penicillin de-labelling strategies. Br J Anaes. 2020;125(6):962-969

Léková (PNC) alergie – protokoly

Studie → Guidelines

Studie (např.):

- du Plessis T, Walls G, Jordan A, Holland DJ. Implementation of a pharmacist-led penicillin allergy de-labelling service in a public hospital. J Antimicrob Chemother. 2019; 74: 1438-1446.
- Reichel A, Röding K, Stoevesandt J, et al. De-labelling antibiotic allergy through five key questions. Clin Exp Allergy. 2020; 50: 532-535
- Cooper L, Harbour J, Sneddon J, Seaton RA. Safety and efficacy of de-labelling penicillin allergy in adults using direct oral challenge: A systematic review. JAC Antimicrob Resist. 2021; 3: dlaa123.
- Iammatteo M, Lezmi G, Confino-Cohen R, Tucker M, Ben-Shoshan M, Caubet JC. Direct challenges for the evaluation of beta-lactam allergy: Evidence and conditions for not performing skin testing. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021; 9:2947-2956.



Guidelines:

- ✓ BSACI guideline for the set-up of penicillin allergy de-labelling services by non-allergists working in a hospital setting (Savic L. et al. Clin Exp Allergy. 2022;52:1135–1141.)

Léková (PNC) alergie – BSACI guidelines zásady

- ✓ Tato doporučení se vztahují na pacienty **v nemocničním prostředí**. Neexistuje dostatek důkazů, aby bylo možné vydat přesvědčivá doporučení ohledně používání provokačních testů v primární péči.
- ✓ Pokyn je určen **pro lékaře ve Velké Británii, kteří nejsou vyuškoleni v oboru alergologie nebo imunologie**, ale kteří chtějí vytvořit službu de-labelingu alergie na PNC a **nevztahuje se na alergie na jiné beta-laktamy**.
- ✓ Nealergologové, kteří poskytují služby de-labelingu, by měli být **propojeni se specializovanou alergologicko-imunologickou službou**, která jim poskytne poradenství a podporu.
- ✓ Nealergologové by měli DPT provádět u pacientů s nízkým rizikem v prostředí, kde lze léčit alergické reakce včetně anafylaxe. **Provokační testování vyžaduje soubor minimálních bezpečnostních standardů**.
- ✓ Měl by být zaveden systém informování praktického lékaře a dalších příslušných zdravotnických pracovníků o výsledku DPT. Pacient by měl obdržet jasné **písemné informace o výsledku testu a jeho důsledcích**.
- ✓ **Prodloužená (vícedávková) DPT** by měla být zvážena, **pokud se předmětná reakce objevila po druhé nebo další dávce penicilinu (nebo pokud není známo načasování reakce)**. U většiny pacientů je dostačující prodloužená DPT trvající 3 dny. Pokud je zřejmé, že k předmětné reakci došlo po více než 3 dnech, je třeba požádat místní nebo regionální alergologickou službu o radu, jak dlouho DPT prodloužit.

Léková (PNC) alergie – BSACI guidelines stratifikace rizika

Podprahové stavy – žádné riziko

- Drobné gastrointestinální příznaky (nevolnost, bolest břicha, průjem). Afty.
- Drobné příznaky nesouvisející s žádnou formou alergické reakce, například bolest hlavy, artralgie, zvláštní chuť v ústech.
- Alergie na penicilin v rodinné anamnéze, ale bez osobní anamnézy alergie.
- Pacient později užíval a toleroval stejné PNC antibiotikum jako v případě předmětné reakce.

A. Přímý de-labelelling



Nízkorizikové stavy – nízké riziko

- "benigní" vyrážka, která se objevila více než 1 hodinu po první dávce PNC. Benigní vyrážka je definovaná jako neuritikární, nesvědčící, nepuchýřující, krátkodobá (méně než 24 h trvající) a nevyžadující léčbu.
- pacient udává vyrážku v děství a jiná anamnéza není k dispozici.
- pacient si nepamatuje, co se stalo, ale bylo mu řečeno, že to nebylo vážné a nevyžadovalo to nemocniční ošetření.

B: přímý DPT



Rizikové stavy – střední a vysoké riziko

- Vyrážka, která se objeví do 1 hodiny po první dávce penicilinu. a/nebo Vyrážka trvající déle než 24 hodin a/nebo postihující více než 10 % povrchu těla.
- Vyrážka spojená s puchýři, olupováním kůže, zánětem sliznic (ocí, ústa, genitálie) či purpurou.
- Pacienti, kteří hlásí jakékoli příznaky svědčící o časné reakci (typu 1), včetně otoků, kopřivky, angioedému, dušnosti, sípání, ztráty vědomí nebo kolapsu.
- Pacienti, u nichž reakce vyžadovala nemocniční ošetření. a/nebo Pacienti, u kterých byla nutná léčba adrenalinem na jejich reakci
- Pacienti, kteří si nepamatují, co se stalo během předmětné reakce, ale bylo jim řečeno, že byla vážná a/nebo vyžadovala lékařský zásah.

C. Reference ad 207 lékové centrum (plné alerg. vyšetření)

Léková (PNC) alergie – BSACI guidelines

Provedení přímého DPT

- ✓ Vyžaduje se **písemný informovaný souhlas**
- ✓ **Před zahájením DPT a po každé podané dávce je třeba zkontolovat krevní tlak, srdeční frekvenci a saturaci kyslíkem a PEF.**
- ✓ Pokud není znám **příčinný penicilin**, měl by být použit **amoxicilin**.
- ✓ Podle místních preferencí lze použít **jednu dávku nebo rozdelenou dávku DPT** (dávky léků by měly být přizpůsobeny věku).
 - **Jednorázová dávka DPT:** 100% plné dávky amoxicilinu (500 mg).
 - **Rozdelená dávka DPT:** 10% plné dávky amoxicilinu (50 mg) .. pozorování po dobu 30 minut .. 50% plné dávky amoxicilinu (250 mg) .. pozorování po dobu 30 minut .. zbytek plné dávky amoxicilinu (200 mg).
- ✓ **Pacient by měl být pozorován 1 hodinu po podání poslední dávky** (pokud je pacient hospitalizován, zajistěte, aby toto pozorování prováděl člen týmu pro de-labeling).
- ✓ Pokud se během testu objeví příznaky odpovídající anafylaxi, ošetřete pacienta (v souladu s pokyny Resuscitační rady pro léčbu anafylaxe).
- ✓ Pacient by měl dostat jasné písemné pokyny, co dělat, pokud se příznaky objeví po opuštění nemocnice.
- ✓ **Prodloužené DPC:** Na konci kurzu je třeba pacienta kontaktovat a zkontolovat, zda došlo k pozdní reakci.

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Zásady

- ✓ Základní schéma v souladu s doporučením BSACI
- ✓ **Rozšíření stratifikace rizika** s ohledem na možnost využití objektivizujících metod a na zvýšení bezpečnosti protokolu
- ✓ **Doplňení metod základního alergologického vyšetřování (slgE, SPT) = menší riziko než. příhod**
 - **Stran slgE** problém volby dodavatele ohledně kvality setů (jednání výboru ČSAKI dne 17. června 2023: Proběhlo 4. pilotní kolo vyšetření spec. IgE na PNC ATB, s obdobným výsledkem jako kola předchozí. Výbor SLI navrhuje opětovné oslovení firem s požadavkem poskytnutí výsledků klinické validace metody. Nebude-li příslušná reakce ze strany firem, jejichž diagnostika ve studii selhávají, navrhuje výbor SLI uveřejnit výsledky pilotních studií na webových stránkách SLI ČSAKI)
 - .. naše interní studie preferují sety ImmunoCAP – Phadia (Thermo Fisher Scientific Inc.)
 - **Stran SPT** předpokladem zajištění originální nativní molekuly v tekuté formě, resp. objednání základního komerčního setů na mimořádný dovoz (umožňuje cílenou obecnou diagnostiku PNC alergie)
 - .. Nativní testy: nedráždivé koncentrace pro SPT jsou dány pozičním dokumentem ENDA/EAACI¹
 - .. Komerční testy: 1) PNC hlavní determinant – PPL (benzylpeniciloyl-poly-L-lysin), 2) PNC minoritní alergen
 - **Další zvažované metody:** BAT
- ✓ Vytvoření rozhodovacího algoritmu (diagramu) usnadňujícího aplikaci protokolu

¹ Brockow K, Garvey LH, Aberer W et al. Skin test concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group position paper. Allergy 2013; 68:702–12.

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Zásady

Kolekce vstupních dat

Non207 de-label centrum +/- PL

Pozn.: 207 = specialistka v ALG
x non207 = lékař neatestovaný v ALG

Stratifikace

A. Přímý de-labelling

B. Objektivizace non207 de-label centrum

C. Reference ad 207 lékové centrum (plné alerg. vyšetření)

Objektivizace

B1: přímý DPT

B2: sIgE / SPT → dDPT

B3: sIgE + SPT → dDPT

27 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Stratifikace

Podprahové stavy – žádné riziko = přímý de-labelling

A. Přímý de-labelling

- nebyla skutečná příhoda (např. pouhá rodinná anamnéza)
- pacient později užíval předmětnou ATB molekulu bez reakce (při příbuzném ATB konzultaci ALG supervizora k dalšímu postupu A/B/C/D)
- příhody s výhradně „podprahovými“ projevy:
 - nekožní: *alternativně* benigní cefalea, palpitace, nevolnost, GIT projevy jako průjem nebo *izolované zvracení, afty*
 - kožní: *kumulativně* exantém bez varovných kožních příznaků* a nutnosti závažné intervence* s nástupem více než 1 týden po poslední dávce ATB, resp. pro kopřívku více než 2 dny po poslední dávce ATB



Rizikové stavy – vysoké riziko = reference ad 207 lékové centrum (plné alerg. vyšetření)

C. Reference ad 207 lékové centrum (plné alerg. vyšetření)

- závažné i jen izolované kožní reakce tj. *alternativně* varovné kožní příznaky*, časně /do 1 hodiny po podání ATB/, vyžadující závažnou intervenci*
- závažné i jen izolované **nekožní reakce** tj. *alternativně* vyžadující závažnou intervenci, závažné multisystémové (vč. kůže + jiný systém) reakce až anafylaxe, příhody v průběhu celkové anestezie)
- neznámé postižení v dospělosti tj. možnost i multisystémového postižení (v dospělosti by ovšem měla být dostupná dokumentace cestou PL)
- kontraindikace dDPT: neschopnost poskytnout informovaný souhlas, těžké nebo nekontrolované astma nebo závažná chronická obstrukční choroba dýchacích cest, těžká aortální stenóza, akutně nemocná nebo klinicky nestabilní (zejména dechově, kardiovaskulární systém), těhotenství, průkaz alergie na PNC v minulosti

28 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Stratifikace

Nízkorizikové stavy – nízké riziko = objektivizace non207 de-label centrum

B1) provedení dDPT (bez dalšího):

B1: přímý
DPT

- izolovaný **urtikáriální výsev „low grade“**: *kumulativně bez varovných kožních příznaků, do 10% tělního povrchu, opožděný (více než 6 hodin od podání dávky ATB), nevyžadující intervenci (případně pouze s podáním H1A a/nebo Ca)*
- izolované určené **benigní neutikáriální kožní postižení**: *kumulativně nesvědící, neutikáriální, bez varovných kožních příznaků, do 10% tělního povrchu, nečasné (více než 1 hodinu od podání ATB), krátkodobé (trvání do 24 h), nevyžadující intervenci (případně pouze s podáním H1A a/nebo Ca)*
- neznámé izolované kožní postižení v předškolním věku – velmi suspektně benigní: nejsou všechny požadované údaje, ale je zřejmé, že stav nevyžadoval závažnou intervenci

pozn.*: definice pojmu:

- **varovné kožní příznaky** = puchýře, olupování kůže, petechie a purpura, angioedém, současně nekožní projevy (s výjimkou podprahových)
- **závažná intervence** = hospitalizace, několikadenní ambulantní intervence, RZP intervence, podání adrenalinu

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Stratifikace

Středně rizikové stavy – nízké a střední riziko = objektivizace non207 de-label centrum

B2) provedení základní objektivizace formou slgE nebo SPT a následně dDPT:

B2: slgE / SPT
→ dDPT

- izolovaný **urtikáriální výsev „medium grade“**: *kumulativně bez varovných kožních příznaků, do 25% tělního povrchu, nečasné (více než 1 hodina od podání ATB), nevyžadující intervenci (případně pouze s podáním H1A)*
- neznámé izolované kožní postižení v předškolním věku – suspektně benigní: nejsou vůbec údaje o reakci a jejím řešení
- neznámé izolované kožní postižení ve školním věku (7-16 let) – velmi suspektně benigní: nejsou všechny požadované údaje, ale je zřejmé, že stav nevyžadoval závažnou intervenci
- neznámé izolované kožní postižení v dospělosti – velmi suspektně benigní: nejsou všechny požadované údaje, ale je zřejmé, že *kumulativně* nebylo svědění, nebyly varovné kožní příznaky, šlo o nečasné stav více než 1 hodinu od podání ATB/ a stav nevyžadoval závažnou intervenci
- **postižení nekožní „low grade“**: *kumulativně „nadprahové“ postižení jednoho systému nevyžadující závažnou intervenci, nečasné /více než 1 hodinu po podání ATB/ a trvající do 24 hodin*

B3) provedení rozšířené objektivizace formou slgE + SPT a následně dDPT:

B3: slgE + SPT
→ dDPT

- izolovaný **urtikáriální výsev „medium grade plus“**: bez varovných kožních příznaků a nevyžadující závažnou intervenci
- izolované **určené neutikáriální kožní postižení rizikové**: *kumulativně nesvědící, neutikáriální, bez varovných kožních příznaků, do 25% tělního povrchu, nečasné (více než 1 hodinu od podání ATB), nevyžadující intervenci (případně pouze s podáním H1A)*
- neznámé izolované kožní postižení ve školním věku (7-16 let) – suspektně benigní: nejsou vůbec údaje o reakci a jejím řešení
- neznámé izolované kožní postižení v dospělosti – suspektně benigní: nejsou všechny požadované údaje, ale je zřejmé, že nebyly varovné kožní příznaky a stav nevyžadoval závažnou intervenci
- **postižení nekožní „medium grade“**: *kumulativně „nadprahové“ postižení i více nekožních systémů +/- benigní kožní postižení, nevyžadující závažnou intervenci*

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Stratifikace

- pouze kožní postižení - projevy:
 - pouze kožní - urtica
 - podprahové (kumulativně viz manuál) → A
 - „low grade“ (kumulativně viz manuál) → B1
 - „medium grade“ (kumulativně viz manuál) → B2
 - „medium grade plus“ (kumulativně viz manuál) → B3
 - závažné i jen izolované kožní postižení (alternativně viz manuál) → C
 - pouze kožní - neutrica
 - podprahové (kumulativně viz) → A
 - izolované určené benigní neurtikární kožní postižení (kumulativně viz manuál) → B1
 - izolované určené rizikové neurtikární kožní postižení (kumulativně viz manuál) → B3
 - „medium grade plus“ (kumulativně viz manuál) → B3
 - závažné i jen izolované kožní postižení (alternativně viz manuál) → C
 - pouze kožní - neznámé
 - předškolní věk → B1
 - školní věk (7-16 let) → B2
 - dospělost → B3
 - pouze kožní - neznámé (a nelze ani vyloučit že stav vyžadoval závažnou intervenci)
 - předškolní věk → B2
 - školní věk (7-16 let) → B3
 - dospělost → C
- pouze nekožní postižení – projevy:
 - pouze podprahové projevy → A
 - nejvýše low grade → B2
 - nejvýše medium grade → B3
 - závažné izolované nekožní (alternativně viz manuál) → C
- kombinované: kožní i další projevy
 - Nekožní projevy grade A (pouze podprahové) → grading dle kožního postižení
 - Nekožní projevy grade B2 (nejvýše low grade) + kožní projevy A nebo B1 (nejvýše B1) → B3
 - Jinak → C

31 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Dotazník, SW



Logged in as Jiri.nevrka | Log out

My Projects

REDCap Messenger

Contact REDCap administrator

Project Home and Design

Project Home · Codebook

Project status: Development

Data Collection

Record Status Dashboard

- View data collection status of all records

Add / Edit Records

- Create new records or edit/view existing ones

Hide data collection instruments

Část 1: Dotazník vstupní

Část 3: Stratifikace (směrování) případu

Applications

Field Comment Log

File Repository

Help & Information

Help & FAQ

Video Tutorials

Suggest a New Feature

Contact REDCap administrator

De-labeling penicilinové alergie - zkoušební

PID 115

Page speed was boosted using Rapid Retrieval

Record Status Dashboard (all records)

Displayed below is a table listing all existing records/responses and their status for every data collection instrument (and if longitudinal, for every event). You may click any of the colored buttons in the table to open a new tab/window in your browser to view that record on that particular data collection instrument. Please note that if your form-level user privileges are restricted for certain data collection instruments, you will only be able to view those instruments, and if you belong to a Data Access Group, you will only be able to view records that belong to your group.

Legend for status icons:

●	Incomplete	●	Incomplete (no data saved)
●	Unverified		
●	Complete		

Dashboard displayed: [Default dashboard] ▾

Displaying record Page 1 of 1: "1" through "2" ▾ of 2 records

ALL (2) ▾ records per page

+ Add new record

Displaying: Instrument status only | Lock status only | All status types

Record ID	Část 3: Stratifikace Dotazník (směrování) případu	
	Část 1: Vstupní	Část 2: Vstupní
1	●	●
2	●	●

SW platforma

MUNI|CREATIC

Central European Advanced
Therapy and Immunotherapy Centre

32 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Dotazník, SW

Část 1: Dotazník vstupní

Record ID _____

Cást 1: vstupní informace

Definice pojmu:

podprávňové projekty, biostatistiky, diagnostika, populacní, Gf je práce s kruhy, ažty podprávňového výzkumu + počítače, diagnostika kazu, počítače s programem, současná neaktivita je významnou podprávňovou) zvláštní intervence = hospitalizace, několikadenní ambulantní intervence, RZP intervence podle aktuálněho stanovení

Definice:

Caždý rok v rámci třídykohenných termínů RIA - H1 probíhají se zájmem o dospívající a dospívající projevy (direct Drug Provocation Test) AIG + specialista alergolog, speciálně alergologické pracoviště ATB + antitoxikum, PNC = penicilinového typu

Identifikace pacienta

Věk (let) _____

Pracovití a pracovník

Zhotovitel _____

Pracovité _____

Datum _____

Kontrolníkadele IDBT Profil a Informační Databásealéria - kde
Neschovali podepsaný informační soubor:
Téžka nebo rekonvalescenční etapa nebo závažná chronická obstrukční choroba dýchacích cest _____
Těžká nebo rekonvalescenční etapa nebo závažná chronická obstrukční choroba dýchacích cest _____
Akutní nemocni nebo klinicky nestabilní (zlepšení dechovky, kardiovaskulární systém) _____
Objevování alergie na ATB (PNC typu) v minutách _____

Data a předmětné příhody

* Specifikace leku

Přeň k informaci: _____

Databázealéria - kde

A1 = zněla
 A2 = nezněla
 A3 = uvedenédatelná pravdopodobná
 A4 = nezněná

Dotazník – písemná podoba

EFB

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Dotazník, SW

* = nutné provedení výberu

Rozaház příhody

Kůže - rozaház:

- * nutné provedení výberu

Kůže - svědění

- * nutné provedení výberu

Kůže - charakter exantému

- * nutné vyplnit fólie typických kabinček náležejících z dom. obrázkových atítků

Varněné kožní příznaky

- * nutné provedení výberu

Jiné systémy

- * nutné provedení výberu

Závažnost příhody (dle interverce)

Přetík k informaci

- * nutné provedení výberu

Místo řešení

- * nutné provedení výberu

Způsob řešení

- * nutné provedení výberu

Barevně označené údaje v datomezíku (červené a zelené písmo) umožňují přímo strukturizaci (mezírování) posuzovaného případu.

C - příjem vyšetření alespoň jednou

Form Status

Complete? Complete

* Casová hlediska			
Prefix k informaci	<input type="radio"/> A1 = známá <input type="radio"/> A2 = dohledatelná <input type="radio"/> A3 = nedohledatelná pravděpodobná <input type="radio"/> X = neznámá		
<hr/>			
Dohledatelná - ide			
V jakém věku	<input type="radio"/> předškolní - do 6 let <input type="radio"/> školní až do 16 let <input type="radio"/> dospělí		
<hr/>			
Po kolikátce dávce	<input type="radio"/> první jednorázové <input type="radio"/> první den aplikace <input type="radio"/> po několika dnech <input type="radio"/> po dobrého báleť		
<hr/>			
Za jak dlouho (po předměrné dávce)	<input type="radio"/> minuty <input type="radio"/> hodiny <input type="radio"/> do 6 hodin <input type="radio"/> po dobu <input type="radio"/> nad 24 hodin		
Nad 24 hodin - specifikace	<hr/>		
 * Rozsah příhody			
Prefix k informaci	<input type="radio"/> A1 = známá <input type="radio"/> A2 = dohledatelná <input type="radio"/> A3 = nedohledatelná pravděpodobná <input type="radio"/> X = neznámá		
<hr/>			
Dohledatelná - ide			
Rozsah příhody	<input type="radio"/> netypické skutečnosti příhoda <input type="radio"/> podpruhové projekty <input type="radio"/> kontak projekt <input type="radio"/> kontak projekt <input type="radio"/> kontak projekt rizikové (kardiokvaskulární, dechové, krevní, renální potíže v možné souvislosti s NLF ATB)		
<hr/>			
Kůže - rozsah:	<input type="radio"/> lokálně <input type="radio"/> celého povrchu <input type="radio"/> nad 25% povrchu <input type="radio"/> celotělově		

Barevné označení údajů v datování (Zároveň v zeleném rámci) umožňuje plnou stratifikaci (semikroužek).

Dotazník – písemná podoba

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Stratifikace - SW

Record ID: Věk 19 **1**

1. KROK: primární určující skutečnosti (alternativní)
* must provide value

varovně kožní příznaky nebo závažná intervence nebo kontraindikace dDPT > C
 nebyla skenována žádatelka, pouhá rodinná anamnesta nebo pacient prozradil vzdálenou předmluvou ATB molekulu bez reakce > A
 pacient prozradil účinky příbuzná ATB RNC typu bez reakce > konzultace ALG supervizora
 jinak: (s vyhotoveným vstupním dotazníkem) přejdi k kroku 2 **reset**

2. KROK: zatrhní (jediné) správné řešení
* pouze kožní postižení - projev:

Pouze kožní - urtica

podpůrné (kumulativní viz manuál) > A.
 "low grade" (kumulativní viz manuál) > B1
 "medium grade" (kumulativní viz manuál) > B2
 "medium grade plus" (kumulativní viz manuál) > B3
 závažné i jen izolované kožní postižení (alternativní viz manuál) > C **reset**

Z předchozích odpovědí vychází:

B2

SW náhled – výstup s možností korekcí

Provedení základní objektivizace formou slgE nebo SPT a následně dDPT (i mimo ALG lékové centrum)

3. KROK - RESUMÉ:
* must provide value

stanoven grading
 nestanoven grading: případ k posouzení ALG lékovým centrem **reset**

Form Status

Complete? **Complete**

Save & Exit Form **Save & Go To Next Form**

35 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Úkoly

Co je třeba dořešit:

- soulad s novými guidelines ?
 - EAACI/ENDA position paper on drug provocation testing. Barbaud A, Garvey LH, Torres M, et al. Allergy. 2024; 79: 565-579.
 - The Dutch Working Party on Antibiotic policy (SWAB) guideline for the approach to suspected antibiotic allergy. Wijakker R., van Maaren MS, Bode LGM, et al. CMI. 2023; 29: 863-875.
- optimalizace dotazníků a SW
 - odolnost vůči neznámým nebo nejasným vstupním datům, dohledatelnost dat (potřebné, zbytné)
 - zpřesnění a/nebo zjednodušení vstupních dat
 - propojení vstupních dat na výsledek (automatické určení stratifikace)

36 22.02.2025

Léková (PNC) alergie – FN Brno projekt

Úkoly

Co je třeba dořešit:

- personální a praktické zajištění non207 de-label centra .. KNPT FNB
- spolupráce s 207 lékovým centrem (plné alerg.vyšetření pro rizikové případy)
- konzultace a posouzení metodiky via ČSAKI (léková skupina) ?
- finalizace metodiky (SOP) a schválení FNB